

متابعة موسم الزراعات الكبرى إلى غاية 28 مارس 2018

الحالة الصحية للزراعة			الحالة العامة للزراعة	مراحل نمو الزراعات			الولاية	
الأعلاف	الفاول المصري	القمح الصلب		الزراعات الصناعية	الأعلاف	الفاول المصري		القمح
-	ظهور مرض لفحة الفول والتبقع الالترناري لأوراق الفول ظهور حشرة السيتون، حشرة الفيتونوم ظهور حشرة حافرة الساق والحشرات الليلية بمنطقة الغزالة	ظهور مرض التبقع السببوري والصدأ الأصفر بأغلب الحقول	حسنة	-	-	مرحلة الأزهار إلى مرحلة تكوين القرون	مرحلة الصعود إلى مرحلة الركبة الثانية بنزرت الجنوبية: الانتفاخ إلى مرحلة الأسبال	بنزرت

التوصيات:

- تطبيق التداول الزراعي للمحافظة على انتاجية الاراضي الزراعية.
- ضرورة تقديم القسط الثالث من مادة الامونيتير (مرحلة الركبة الثانية) خاصة بعد الامطار الأخيرة (بالنسبة للحبوب في مراحل ما قبل الأسبال)
- ظهور مرض التبقع السببوري بالأوراق السفلى وبالتالي المراقبة الدورية لتطور الأمراض الفطرية في حقول الحبوب والمداواة عند الاقتضاء باستعمال المبيدات المنصوح بها.
- ظهور مرض لفحة الفول والتبقع الالترناري لأوراق الفول والميلديو بأغلب حقول الفول المصري وبالتالي ضرورة المداواة باستعمال المبيدات الفطرية المنصوح بها.
- اعتماد تباعد 0.5 م بين الموزعات (بالنسبة للري قطرة - قطرة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد).