

متابعة موسم الزراعات الكبرى إلى غاية 28 مارس 2018

الحالة الصحية للزراعة			مراحل نمو الزراعات					الولاية
الأعلاف	الفاول المصري	القمح الصلب	الحالة العامة للزراعة	الزراعات الصناعية	الأعلاف	الفاول المصري	القمح	
- ظهور ذبابة الهس - التبقع الشبكي	-	انتشار اللبسان والقوانة والبروم	متوسطة	السلجم الزيتي بمنطقة برج شكير: الأزهار الى تكوين القرون	-	الأزهار	نهاية الصعود الى بداية الأسبال	تونس: بيرين
	ظهور حشرة السيتونو الليكسوس والتبقع الالترناري ومرض الصدأ	انتشار عشب اللبسان ظهور البياض الدقيقي	متوسطة مع ظهور علامات الجفاف والاجهاد المائي	الأزهار تكوين القرون	-	الأزهار - تكوين القرون	نهاية الصعود - الأسبال	بن عروس: - المحمدية - سيدي فرج
ظهور مرض البياض الدقيقي	مرض لفحة الفول (ANTHRACNOSE)	-انتشار لعشب اللبسان والسيبانه -مرض الصدأ الأصفر -التبقع السببوري على مستوى الأوراق السفلى	حسنة	-	-	الأزهار - تكوين القرون	الأسبال	أريانة: - سيدي ثابت
-	ظهور مرض الذبول على الحمص	ظهور حشرة limaces وcriocères	حسنة	-	-	الأزهار	نهاية الصعود الأسبال	منوبة: طبربة

التوصيات:

- تطبيق التداول الزراعي للمحافظة على إنتاجية الأراضي الزراعية.
- ضرورة تقديم القسط الثالث من مادة الامونينتر (مرحلة الركبة الثانية) خاصة بعد الامطار الأخيرة (بالنسبة للحبوب في مراحل ما قبل الإسبال)
- ظهور مرض التبقع السببوري بالأوراق السفلى وبالتالي المراقبة الدورية لتطور الأمراض الفطرية في حقول الحبوب والمداواة عند الاقتضاء باستعمال المبيدات المنصوح بها.
- ظهور مرض لفحة الفول والتبقع الالترناري لأوراق الفول والميلديو بأغلب حقول الفول المصري وبالتالي ضرورة المداواة باستعمال المبيدات الفطرية المنصوح بها.
- اعتماد تباعد 0.5 م بين الموزعات (بالنسبة للري قطرة - قطرة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد).