

## متابعة موسم الزراعات الكبرى إلى غاية 28 مارس 2018

الحالة الصحية للزراعة			الحالة العامة للزراعة	مراحل نمو الزراعات			الولاية	
الأعلاف	الفول المصري	القمح الصلب		الزراعات الصناعية	الأعلاف	الفول المصري		القمح
-	مرض لفحة الفول والتبقع الالترناريو الميلديو	مرض التبقع السببوري بالأوراق السفلى	حسنة	-	-	الازهار	مرحلة الصعود الى مرحلة الركبة الثانية	جندوبة: فرناتة

### التوصيات:

- تطبيق التداول الزراعي للمحافظة على انتاجية الاراضي الزراعية.
- ضرورة تقديم القسط الثالث من مادة الامونيتير (مرحلة الركبة الثانية) خاصة بعد الامطار الأخيرة (بالنسبة للحبوب في مراحل ما قبل الإسبال)
- ظهور مرض التبقع السببوري بالأوراق السفلى وبالتالي المراقبة الدورية لتطور الأمراض الفطرية في حقول الحبوب والمداواة عند الاقتضاء باستعمال المبيدات المنصوح بها.
- ظهور مرض لفحة الفول والتبقع الالترناريو لأوراق الفول والميلديو بأغلب حقول الفول المصري وبالتالي ضرورة المداواة باستعمال المبيدات الفطرية المنصوح بها.
- اعتماد تباعد 0.5 م بين الموزعات (بالنسبة للري قطرة - قطرة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد).