

متابعة موسم الزراعات الكبرى إلى غاية 28 مارس 2018

الحالة الصحية للزراعة			مراحل نمو الزراعات					الولاية
الأعلاف	الفاول المصري	القمح الصلب	الحالة العامة للزراعة	الزراعات الصناعية	الأعلاف	الفاول المصري	القمح	
-	-	-	المروي: متوسطة إلى حسنة	-	-	-	من الصعود إلى التسبيل	القيروان: القطنانية
ظهور مرض التبقة الشبكي	-	تواجد الأعشاب الضارة ذات الفلقتين: اللبسان والقحوانة	حسنة	-	-	-	الصعود إلى مرحلة الأسبال	سوسة: بوفيشة
ظهور مرض الصدأ التاجي في زراعة القصبية	-	انتشار عشب المنجور والزيوان	جيدة	-	-	-	مرحلة الصعود إلى الأسبال	سيدي بوزيد
-	-	-	متوسط	-	-	-	المروي: مرحلة الصعود إلى الأسبال المطري: دون المتوسط مرحلة التجذير	القصرين

التوصيات:

- تطبيق التداول الزراعي للمحافظة على إنتاجية الأراضي الزراعية.
- ضرورة تقديم القسط الثالث من مادة الامونيتر (مرحلة الركبة الثانية) خاصة بعد الامطار الأخيرة (بالنسبة للحبوب في مراحل ما قبل الإسبال).
- ظهور مرض التبقة السبتي بالاوراق السفلى وبالتالي المراقبة الدورية لتطور الأمراض الفطرية في حقول الحبوب والمداواة عند الاقتضاء باستعمال المبيدات المنصوح بها.
- ظهور مرض لفحة الفول والتبقة الالترناري لأوراق الفول والميلديو بأغلب حقول الفول المصري وبالتالي ضرورة المداواة باستعمال المبيدات الفطرية المنصوح بها.
- اعتماد تباعد 0.5 م بين الموزعات (بالنسبة للري قطرة - قطرة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد).