



خارطة توزيع أصناف الحبوب التونسية الأحسن ترتيباً حسب المواقع التجريبية للمعهد للموسم 2016 - 2020



اعتماداً على نتائج 5 مواسم متتالية من 2016 إلى 2020

إعداد السيد: رمضان النصراوي
علاء الدين بن عرعار

أصناف الحبوب التونسية الملائمة للطوابق البيومناخية



في المناطق الرطبة وشبه الرطبة وفي المروي: الرطبة ■ شبه الرطبة

✓ القمح الصلب: إنرات 100، كاريوكا، منستير، بورطودور، ذهي، معالي، سليم أصناف ذات انتاجية عالية يمكن تكثيف زراعتها تقاضليا في المناطق الرطبة وشبه الرطبة وفي المروي شريطة العناية بالزراعة وتطبيق الحزم الفنية المناسبة. بقية الأصناف على غرار سكلتور، كريم ، أزمور ذات انتاجية طيبة ويمكن أيضا زراعتها بدرجة ثانية في هذه المناطق ولكن.

✓ القمح اللين: جل الأصناف القمح اللين الجديدة لها انتاج مرتفع ومتقارب. في المناطق المعنية يحذى بدرجة أولى زراعة الأصناف حسب الترتيب تاهنت، كوزاكو، زنزيبار، أكور. وبدرجة ثانية بقية الأصناف أوتيك، حيدرة، سنساس

في المناطق شبه الجافة

العليا

✓ القمح الصلب: ينصح في هذه المناطق بزراعة الأصناف حسب الترتيب التقاضي: كاريوكا، بروطودور، منستير، سليم، إنرات 100 و رذاق . وبدرجة ثانية معالي ، سكلتور و ذهي (صنف جديد مازال في بداية التجربة).

✓ القمح اللين: يستحسن بدرجة أولى زراعة الأصناف تاهنت، أكور، زنزيبار وبدرجة ثانية . أوتيك، كوزاكو، حيدرة

✓ الشعير: ينصح زراعة أصناف الشعير حسب الترتيب التقاضي: كنوذ، ريحان، أرتوبيو، سكستين

المتوسطة

: تعطى الأولوية في هذه المناطق لزراعة القمح اللين والشعير

✓ القمح الصلب: منستير، كاريوكا، رذاق، إنرات 100، سليم، بورطودور.

✓ القمح اللين: يستحسن زراعة الأصناف: أكور، تاهنت، زنزيبار.

✓ الشعير: ينصح بزراعة الصنفين: كنوذ وريحان.

السفلى : تعطى الأولوية في هذه المناطق لزراعة الشعير صنف ريحان وكنوذ ويمكن زراعة بعض الأصناف المحلية من القمح (إنرات 69، شيلي، بسكري...) والشعير (عربي، سويحي، عرضاوي...).

في المناطق الجافة :

العليا

: في هذه المناطق الجافة يمكن زراعة بعض الأصناف القديمة من الشعير (عربي، سويحي، عرضاوي...).