

التحكم في الأعشاب الضارة بمزارع السلجم الزيتي

الأصناف المتحملة للمبيدات العشبية PR 45H72, PR 45H73	الأصناف العادية JURA, TRAPPER	فترة التدخل
■ إستعمال مبيد يحتوي على مادة التريفليرالين بكمية 2 ل/هك	■ إستعمال مبيد يحتوي على المادة الفعالة ميتازاكور "تويقا" بكمية 2 ل/هك	الهداوة قبل البذر
■ المبيد نوباسرون مع زيت مثبت داش بكمية (1.5 ل + 1.5 ل) في المكثار	■ إستعمال المبيد لوتترال 100 بكمية 1 ل/هك مع ضرورة إضافة زيت مثبت	الهداوة بعد البذر وقبل البزوغ
■ سيلاكت سوبر بكمية 1 ل/هك	■ فوكيس إترا بكمية 2 ل/هك	الهداوة خلال مراحل النمو
■ سوبر قالون أو فارديك بكمية 1 ل/هك	■ سوبر قالون أو فارديك بكمية 1 ل/هك	
		<p>■ ضد الأعشاب ذات الفلقتين</p> <p>مرحلة ورقتين إلى ثمانية أوراق</p> <p>■ ضد النجيليات</p> <p>في مرحلة ثلاث إلى أربع أوراق حقيقية</p>

ملاحظات هامة

- نجاح عملية الهداوة قبل البذر وبعد البذر - قبل البزوغ جد مرتبط بتوفر الرطوبة في التربة.
- عند اعتماد تقنية البذر المباشر يتم الإستثناء عن الهداوة قبل البذر وبعد البذر - قبل البزوغ و تعويضها بإستعمال مبيد كلب قبل البذر يحتوي مادة القليفوزات بكمية 2ل.
- المبيدات المحتوية على المادة الفعالة سيمازين غير مرخص لها على زراعة السلجم ولا يمكن إستعمالها.

